

Verrutrix® Acido Salicílico 15%

Apósitos
Venta Bajo Receta

COMPOSICION

Acido salicílico 15%.
Excipientes autorizados por el M. S. y A.S.: Goma karaya, polietilenglicol 400, propilenglicol, edta disódico, csp 100%.

DESCRIPCION

Es un sistema unidosis de liberación dérmica de ácido salicílico disperso en un apósito adhesivo de goma karaya y otros excipientes. El sistema está diseñado para ser aplicado en forma tópica al tejido verrugoso y proveer contacto constante del principio activo durante las ocho horas del tratamiento. Cada apósito se recubre de una cinta autoadhesiva que genera un beneficioso efecto oclusivo. Los apósitos están envasados en un sobre de aluminio y polietileno, resistente a la humedad. Al aplicarse, los apósitos son fijados en el lugar a tratar con tiras autoadhesivas dermocompatibles provistas en el envase. También se incluyen elementos que circunscriben el tejido verrugoso para protección de la piel periférica y una lima para remover el tejido verrugoso desnaturalizado por el tratamiento del día anterior.

ACCION TERAPEUTICA

La actividad farmacológica del apósito, se atribuye al ácido salicílico (15%). La actividad queratolítica del ácido salicílico produce una remoción mecánica de las células del estrato córneo infectadas por virus del papiloma. El ácido salicílico facilita la descamación por solubilización del cemento intercelular que une las células del estrato córneo de la piel, desprendiéndose, en consecuencia, los corneocitos queratinizados. Este efecto queratolítico puede proveer además acción antifúngica, debido a que la remoción del estrato córneo suprime el crecimiento de hongos y ayuda también a la penetración de otros agentes antifúngicos. El ácido salicílico posee además una suave actividad antiséptica. La aplicación del ácido salicílico por un sistema de liberación dérmico provee una dosificación más constante en el estrato córneo que las tradicionales fórmulas con colodión, las cuales tienden a descargar su concentración de ácido salicílico luego de la evaporación de los solventes. La cinta autoadhesiva hipoalérgica mantiene la zona hidratada permitiendo una mejor penetración del principio activo y un incremento de la queratolisis del tejido verrugoso.

INDICACIONES

Tratamiento de verrugas y callosidades.

CONTRAINDICACIONES

El balance riesgo/beneficio debe ser considerado para el empleo del producto en pacientes afectados de hipersensibilidad al ácido salicílico, diabetes o trastornos circulatorios.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Sólo para uso externo. Los apósitos no deben ser puestos en contacto con los ojos o membranas mucosas. Debe evitarse que entre en contacto con la piel sana adyacente. El tratamiento deberá ser discontinuado si se produce una excesiva irritación adyacente a la zona tratada. No aplicar sobre piel inflamada, irritada o infectada. Este producto no debe ser usado en lunares, marcas de nacimiento, verrugas urogenitales, verrugas faciales, verrugas orales, verrugas nasales o verrugas con pelo. No utilizar en niños menores de 12 años sin indicación del médico. Se desaconseja el uso concomitante de otros productos que contengan agentes exfoliantes, alcohol, jabones abrasivos, cosméticos o jabones desecantes u otra medicación tópica para la piel, salvo mejor criterio médico. No aplicar en extensas áreas del cuerpo, en pacientes embarazadas ni en niños pequeños; en estos últimos evitar el uso durante períodos prolongados debido a que presentan mayor riesgo de toxicidad por absorción del ácido salicílico a través de la piel. Si por error algún apósito fuese aplicado sobre mucosas, usted deberá quitar el apósito, lavarse con abundante agua y si aparece irritación, consultar a su médico. Si algún niño colocara en su boca algún/os apósito/s, usted debería proceder a llamar a su médico, o concurrir con su niño al hospital más cercano o comunicarse con los centros de Toxicología (Ver SOBREDOSIFICACION)

REACCIONES ADVERSAS

Puede producirse irritación localizada cuando los apósitos son puestos en contacto con la piel sana existente alrededor de la lesión. En este caso, la suspensión temporaria del tratamiento resolverá dicha irritación. Al retomar la aplicación deberá ponerse especial atención en adecuar el tamaño del apósito al de la verruga.

SOBREDOSIFICACION

En caso de ingestión o ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología: Hospital de Pediatría (011) 4962-6666/2247. Hospital A. Posadas (011) 4654-6648 ó 4658-7777.

CONSERVACION

Se recomienda cerrar el sobre de aluminio cada vez que se abra para sacar un apósito: doblar el extremo abierto y así evitará la acción de la humedad sobre el apósito. Conservar a temperatura menor a 38°C.

Fecha de última revisión: 16/06/00

PRESENTACIONES

Envases conteniendo:
- 10 ó 20 apósitos dérmicos dispuestos en sobres de aluminio.
- 10 ó 20 elementos protectores autoadhesivos hipoalérgicos.
- 10 ó 20 cintas autoadhesivas hipoalérgicas
- 1 lima.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE.

Certificado N° 55665

Información para el paciente: Forma de uso

SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES ATENTAMENTE PARA UNA CORRECTA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO:

Los apósitos se aplican una sola vez al día, por la noche antes de acostarse siguiendo cuidadosamente las instrucciones de uso y deben mantenerse durante toda la noche (aproximadamente 8 hs.), descartándose por la mañana. Este procedimiento debe ser repetido hasta la desaparición de la lesión.

Antes de acostarse:


1. Con sus manos limpias, lave la zona donde está su verruga, séquela y utilizando la lima provista, pásela sobre la verruga varias veces sin lastimar.



2. Humedezca la verruga con agua tibia utilizando un hisopo de algodón. Seque la piel que rodea a la verruga.




3. Colocar el protector de piel sana, de tal forma que la verruga asome por el orificio. Pegue el protector adhesivo, presionando sobre la piel, sobre todo el borde del orificio. (Protector y tira adhesiva están hechos con material biomédico hipoalérgico).



4. Abra uno de los sobres con los apósitos, por un extremo. Extraiga la vaina con los apósitos. Despegue uno y aplíquelo sobre la verruga. Guarde nuevamente la vaina en su sobre y ciérrelo.



5. Tome una plancha con las tiras adhesivas, despegue una y aplíquela sobre el apósito pegando los extremos de la tira sobre el protector y la piel a ambos lados de la verruga. No presione el apósito en exceso.



Al levantarse:

Despegue, quite y descarte todos los elementos usados: Tira adhesiva, apósito y protector de piel sana.



PHARMATRIX

Elaborado por Laboratorio Pharmatrix, Div. Therabel Pharma S.A.
Arenales 259. Ramos Mejía. Buenos Aires. Argentina.
Director Técnico: Betina Martínez. Farmacéutica.
Industria Argentina