

# Micopul® Miconazol Nitrato 2%

Crema

Venta Bajo Receta  
USO EXTERNO

## COMPOSICION

Cada 100 g contiene:

Miconazol nitrato 2.0 g, alcohol 10.0 g, polietilenglicol 400 10.0 g, cera autoemulsionable no iónica 8.0 g, prolipid 141 (estearato de glicerilo, alcohol behenilico, ácido palmítico, ácido esteárico, lecitina, alcohol laurico, alcohol mirístico, alcohol cetílico) 4.0 g, goma xántica 1.0, imidazolidinil urea 0.3 g, metilparabeno 0.2 g, propilparabeno 0.1 g, butilhidroxitolueno 0.1 g, trietanolamina c.s.p. pH, agua purificada c.s.p. 100 g.

## ACCION TERAPEUTICA

Antimicótico de amplio espectro.

## INDICACIONES

Tratamiento de micosis superficiales producidas por hongos sensibles al miconazol.

## CARACTERISTICAS FARMACOLOGICAS

Fungistático, puede ser fungicida dependiendo de la concentración. Inhibe la biosíntesis de ergosterol u otros esteroides, dañando la pared celular del hongo, alterando su permeabilidad. También inhibe la biosíntesis de triglicéridos y fosfolípidos del hongo, con aumento de las concentraciones tóxicas de peróxido de hidrógeno, lo que contribuye al deterioro de las organelas celulares y a la necrosis celular.

En Cándida albicans inhibe la transformación de las blastosporas a la forma micelar invasiva.

Absorción sistémica: es mínima cuando se aplica sobre la piel. Eliminación renal y fecal en pequeñas concentraciones.

## POSOLOGIA Y FORMA DE ADMINISTRACION

Aplicar suficiente cantidad de Micopul para cubrir la zona afectada, masajeando suavemente con las puntas de los dedos sobre la lesión. Efectuar 2 ó 3 aplicaciones diarias durante el tiempo prescrito por el médico.

## CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad al miconazol o cualquier otro componente de la formulación.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Embarazo: No existen estudios bien controlados en humanos por lo que deberá evaluarse su riesgo/beneficio.

Lactancia: No se conoce si el miconazol es excretado por la leche materna, pero no se han documentado problemas.

Pediatría: Si bien no existen estudios apropiados, no se han observado efectos adversos en este grupo etáreo. La dosis es la misma que en adultos.

Ancianos: Si bien no existen estudios apropiados, no se han observado efectos adversos en este grupo. La dosis es la misma que en adultos.

Evitar contacto con los ojos. No aplicar curas oclusivas salvo indicación médica.

## REACCIONES ADVERSAS

Son pocas frecuentes y debido a hipersensibilidad (ardor, prurito, rubefacción y otros signos de irritación no presentes antes de la terapia).

## SOBREDOSIFICACION

En caso de ingestión o ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología: Hospital de Pediatría (011) 4962-6666/2247. Hospital A. Posadas (011) 4654-6648 ó 4658-7777.

## CONSERVACION

Mantener en lugar seco, entre 15° C y 30° C.

Fecha de última revisión: 20/12/2007

## PRESENTACIONES

Pomos conteniendo 40 g.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.  
ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD.

Certificado N° 54095



**PHARMATRIX**

Elaborado por Laboratorio Pharmatrix, Div. Therabel Pharma S.A.  
Arenales 259. Ramos Mejía. Buenos Aires. Argentina.  
Director Técnico: Betina Martínez. Farmacéutica.  
Industria Argentina

1

Frente

13,0 cm

Dorso

prospecto\_micopul\_crema\_10.ai

17,5 cm